

Klinické studie

Difúzní velkobuněčný B lymfom

1. linie léčby

Studie pro pacienty s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) 1. linie léčby

CLSG-CNS-01 akademická studie pro nově dg. DLBCL,

TED 16364 studie pro relabované/refrakterní NHL

GCT3013-02 studie pro pacienty s DLBCL a FL

M20-621 studie pro nové DLBCL

GCT 3013-06 studie pro nově dg. DLBCL

M22-132 studie pro nově dg. a R/R DLBCL

OLYMPIA 3 studie pro nově dg. DLBCL

Studie pro pacienty s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) 1. linie léčby

GCT3013-03 studie pro pacienty s transformací CLL/SLL do
agresivního lymfomu

CLSG-CNS-01

Název protokolu:	CLSG-CNS-01
Cílová skupina nemocných:	Pacienti s nově diagnostikovaným DLBCL
Design studie:	i. th. MTX vs. systémový HD-MTX u pac. s DLBCL a rizikem CNS diseminace, studie fáze III
Centrum:	Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK

TED 16364

Název protokolu:	TED 16364
Cílová skupina nemocných:	relabované/refrakterní NHL
Design studie:	trispécifická protilátka, v monoterapii, s navyšující se dávkou, studie fáze I
Centrum:	I. Interní klinika VFN a 1. LF UK

GTC3013-02

Název protokolu:	GTC3013-02
Cílová skupina nemocných:	1. linie DLBCL, IPI 3-5, 1. linie DLBCL starší, komorbidní, R/R FL a R/R DLBCL nevhodní k HD terapii
Design studie:	Epcoritamab + chemoterapie, studie fáze 1b/2
Centrum:	I. Interní klinika VFN a 1. LF UK IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU

M20-621

Název protokolu:	M20-621
Cílová skupina nemocných:	nově dg. DLBCL, IPI 3-5
Design studie:	Epcoritamab/placebo + R-CHOP, studie fáze 3, open label
Centrum:	I.interní klinika VFN a 1.LF UK Klinika hematookologie FN Ostrava a LF OU

GCT 3013-06

Název protokolu:	GCT 3013-06
Cílová skupina nemocných:	nově dg. DLBCL, starší pacienti
Design studie:	Epcoritamab +/- lenalidomid, fáze 2
Centrum:	I.interní klinika VFN a 1.LF UK IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK
Předpokládané datum ukončení náboru:	nábor částečně pozastaven

M22-132

Název protokolu:	M22-132
Cílová skupina nemocných:	nově dg. a relabované/refrakterní DLBCL
Design studie:	epcoritamab v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivými (např. lenalidomid, ibrutinib, pola-R-CHP), studie fáze 1b/2
Centrum:	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Klinika hematologie FN Ostrava a LF OU

OLYMPIA 3

Název protokolu:	OLYMPIA 3
Cílová skupina nemocných:	nově dg. DLBCL, IPI 3-5
Design studie:	R-CHOP +/- odronextamab, studie fáze 1b, výhledově 3
Centrum:	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK

GCT3013-03

Název protokolu:	GCT3013-03
Cílová skupina nemocných:	Transformace CLL do agresivního lymfomu
Design studie:	Rameno A: LOXO-305 + Venetoclax + R Rameno B: Venetoclax + R
Centrum:	I.Interní klinika VFN a 1.LF UK