

# Klinické studie

## Folikulární lymfom

### 1. linie léčby

# Studie pro pacienty s folikulárním lymfomem (FL)

## 1. linie léčby

---

**PCYC-1141-CA** studie pro pacienty > 70 let nebo > 60 let s komorbiditami

**RI 01 006 (Flinter)** studie pro pacienty s malou nádorovou masou

**GS-US-313-1580** studie pro pacienty s nově diagnostikovaným FL

**GTC3013-02** studie pro pacienty s B-NHL

# PCYC-1141-CA

<b>Název protokolu:</b>	<b>PCYC-1141-CA</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	FL u pacientů nad 70 let nebo pacientů nad 60 let s komorbiditami
<b>Design studie:</b>	Rituximab + Ibrutinib versus Rituximab + Placebo, studie fáze III
<b>Centrum:</b>	IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové a LF UK Klinika hematonekologie, FN Ostrava a LF OU Onkologická klinika, FN Motol a 2.LF

## RI 01 006 (Flinter)

<b>Název protokolu:</b>	<b>RI 01 006 (Flinter)</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	Pacienti s nově diagnostikovaným FL s malou nádorovou masou
<b>Design studie:</b>	Rituximab versus biosimilární rituximab, studie fáze III
<b>Centrum:</b>	I. interní klinika VFN a 1.LF UK IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové a LF UK Klinika hematoonkologie, FN Ostrava a LF OU

# GS-US-313-1580

<b>Název protokolu:</b>	<b>GS-US-313-1580</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	Pacienti s nově diagnostikovaným FL
<b>Design studie:</b>	Optimalizace bezpečnosti a účinnosti chronického podávání idelalisibu, v dávce 150 mg nebo 100 mg dvakrát denně
<b>Centrum:</b>	Onkologická klinika, FN Motol a 2.LF UK

# GTC3013-02

<b>Název protokolu:</b>	<b>GTC3013-02</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	Pacienti s B-NHL
<b>Design studie:</b>	Epcoritamab + chemoterapie, studie fáze 1b/2
<b>Centrum:</b>	IV. Interní hematologická klinika, FN Hradec Králové a LF UK