

# Klinické studie

**Folikulární lymfom  
relabující/refrakterní**

Studie pro pacienty  
**s folikulárním lymfomem (FL)**  
relabujícím/refrakterním

---

**GTC3013-02** studie pro relabované/refrakterní FL

**IN-MIND** studie pro relabované/refrakterní FL a MZL

**NP 30179** studie pro relabované/refrakterní FL

# GTC3013-02

<b>Název protokolu:</b>	<b>GTC3013-02</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	1. linie DLBCL, IPI 3-5, 1. linie DLBCL starší, komorbidní, R/R FL a R/R DLBCL nevhodní k HD terapii
<b>Design studie:</b>	Epcoritamab + chemoterapie, studie fáze 1b/2
<b>Centrum:</b>	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK

# IN-MIND

<b>Název protokolu:</b>	<b>MOR0208C301</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	relabované/refrakterní FL a MZL
<b>Design studie:</b>	rituximab + lenalidomid + tafasitamab/placebo, studie fáze 3
<b>Centrum:</b>	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK I. interní klinika VFN a 1. LF UK

# NP 30179

<b>Název protokolu:</b>	<b>NP 30179</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	studie pro pacienty s R/R FL gr.1-3a, (po 2 liniích léčby)
<b>Design studie:</b>	Bispecifická monoklonální protilátka glofitamab
<b>Centrum:</b>	I. interní klinika VFN a 1. LF UK