

# Klinické studie

## Lymfom z plášt'ových buněk relabující/refrakterní

Studie pro pacienty  
**s lymfomem z pláštěvých buněk (MCL)**  
relabující/refrakterní

---

**BRUIN-MCL** studie pro relabované/refrakterní MCL, BTKi naive

**CLSG-MCL-POLA** studie pro R/R MCL po léčbě BTKi

# BRUIN-MCL

<b>Název protokolu:</b>	<b>LOXO-BTK-20019</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	relabované/refrakterní MCL, BTKi naive
<b>Design studie:</b>	pirtubrutinib vs. ibrutinib, studie fáze 3
<b>Centrum:</b>	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MUNI

# CLSG-MCL-POLA

<b>Název protokolu:</b>	<b>CLSG-MCL-POLA</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	R/R MCL po léčbě BTKi
<b>Design studie:</b>	Pola-BR u pacientů po předchozí léčbě inhibítorem BTK, akademická studie fáze 3
<b>Centrum:</b>	I. interní klinika VFN a 1. LF UK Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MUNI IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UPOL Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň a LF UK