

Klinické studie

Difúzní velkobuněčný B lymfom

1. linie léčby

Studie pro pacienty s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) 1. linie léčby

GOLSEEK-1 studie pro pacienty s nově dg. DLBCL

OLYMPIA 3 studie pro pacienty s nově dg. DLBCL

M22-132 studie pro pacienty s nově dg. DLBCL a relabovaným/refrakterním MCL, FL, DLBCL

GOLSEEK-1

Název protokolu:	CA0731020
Cílová skupina nemocných:	nově dg. DLBCL
Design studie:	R-CHOP + golcadomid/placebo, studie fáze 3
Centrum:	I.interní klinika VFN a 1.LF UK Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň a LF UK Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UPOL IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK

OLYMPIA 3

Název protokolu:	OLYMPIA-3
Cílová skupina nemocných:	nově dg. DLBCL, IPI 3-5
Design studie:	R-CHOP +/- odronextamab studie fáze 3
Centrum:	I.interní klinika VFN a 1.LF UK IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK

M22-132

Název protokolu:	M22-132
Cílová skupina nemocných:	nově dg. a relabované/refrakterní DLBCL, MCL a FL
Design studie:	epcoritamab v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivy (např. lenalidomid, ibrutinib, pola-R-CHP), studie fáze 1b/2
Centrum:	Klinika hematonekologie FN Ostrava a LF OU