



# Klinické studie

## Lymfom z marginální zóny relabující/refrakterní

Studie pro pacienty  
**s lymfomem z marginální zóny (MZL)**  
relabujících/refrakterní

---

**LOTIS-7** studie pro relabujících/refrakterní B-NHL

**OLYMPIA 5** studie pro pacienty s R/R FL, MZL

# LOTIS-7

<b>Název protokolu:</b>	<b>ADCT-402-105</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	R/R B-NHL, po 2 liniích léčby, potvrzená exprese CD19
<b>Design studie:</b>	loncastuximab tesirine + gemcitabin, lenalidomid, polatuzumab vedotin, umbralisib, studie fáze 1
<b>Centrum:</b>	Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK

# OLYMPIA 5

<b>Název protokolu:</b>	<b>OLYMPIA-5</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	R/R FL, R/R MZL
<b>Design studie:</b>	odronextamab + lenalidomid vs. rituximab + lenalidomid, studie fáze 3
<b>Kontaktní osoby na centru:</b>	I.interní klinika VFN a 1.LF UK IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK